


Buletin nivometeorologic pentru perioada 31.03.2025 ora 21 - 03.04.2025 ora 21

METEO






ROMANIA



CARPAȚII MERIDIONALI: masivele BUCEGI, FĂGĂRAȘ

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m, stratul de zăpadă nou-depus va fi umezit în cursul zilei, iar noaptea, când temperaturile vor fi negative, va îngheța, formând cruste. În următorul interval se va depune un nou strat de zăpadă, care va fi însă redus. Stratul superior, umezit ziua, poate aluneca peste stratul vechi existent, mai ales pe pantele înclinate cu acumulări mai consistente, ducând la declanșarea de avalanșe mici sau medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. În cazuri izolate, avalanșele pornite de la altitudini înalte pot coborî sub altitudinea de 1800 m - risc **moderat (2)**

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche. Precipitațiile sub formă de ploaie vor favoriza în continuare diminuarea stratului de zăpadă rămas.






Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.



Buletin nivometeorologic pentru perioada 31.03.2025 ora 21 - 03.04.2025 ora 21

**CARPAȚII MERIDIONALI: PARÂNG, ȚARCU-GODEANU
CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU**

RISC 1 - REDUS



La peste 1800 m stratul de zăpadă este umezit, mai ales la suprafață. În perioada care urmează, zăpada se va umezi suplimentar în cursul zilei, când temperaturile vor fi pozitive, apoi noaptea stratul superficial va îngheța, formând cruste. Precipitațiile mixte care vor urma, vor mai depune un strat mic de zăpadă la peste 2000 m. În cursul zilei, stratul superior, umezit, poate aluneca peste cel vechi, favorizând unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. Riscul este **redus (1)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este topit, exceptând unele văi umbrite, unde mai este un strat redus de zăpadă veche. Precipitațiile sub formă de ploaie vor favoriza în continuare diminuarea stratului de zăpadă rămas.

CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE



Stratul de zăpadă nou-depus la altitudini înalte este redus. Precipitațiile predominant sub formă de ploaie la altitudini joase vor reduce în continuare zăpada rămasă, iar a altitudini de peste 1800 m vor fi precipitații mixte și se poate depune un strat nou de zăpadă proaspătă și umedă.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 31.03.2025 ora 21 - 03.04.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost în general închisă și mai caldă față de normalul termic al perioadei. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații ce au avut mai ales caracter de aversă, ploi la altitudini mai mici de 1800 m, iar în zonele înalte, îndeosebi ale Carpaților Meridionali, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse în masivele din sud-vestul țării cantitățile de apă cumulate au depășit 80-90 l/mp și s-a depus strat de zăpadă, izolat consistent în zonele înalte, mai ales în ziua de 28 martie, care apoi s-a topit progresiv; în restul masivelor stratul de zăpadă depus a fost mai mic. Vântul a avut rafale în general de 60-70 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali a depășit izolat 120 km/h. Local s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă a crescut ușor în toate masivele, cu până la 12...14 cm și este discontinuu la altitudini mai mici de 1800 m.

În data de 31.03.2025, la ora 15, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 84 cm la Vf. Omu, 36 cm la Bâlea-Lac, 8 cm la Vf. Țarcu

Carpații Orientali: 60 cm la Vf. Călimani, 53 cm la Ceahlău-Toaca, 35 cm la Vf. Lăcăuți, 10 cm la lezer

Carpații Occidentali: 8 cm la Vf. Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 31.03.2025 ora 21 - 03.04.2025 ora 21

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată în prima zi, apoi temperaturile vor scădea treptat, devenind normală termic. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse, ce pot fi însoțite izolat de descărcări electrice. Precipitațiile vor fi în general slabe, mixte la altitudini de peste 1800 m și ploi la altitudini joase. Izolat, cantitățile de apă cumulate vor depăși 25...35 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 40...45 km/h, iar pe creste 50...60 km/h. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 31.03.2025 ora 21 - 03.04.2025 ora 21:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -6...-1 grade în primele două nopți, apoi în scădere, -9...-4 grade în 2/ 3 aprilie

temperaturi maxime: -3...4 grade în 1 și 2 aprilie, apoi în scădere, -5...1 grad în 3 aprilie

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -2...3 grade în primele două nopți, apoi în scădere, -4...0 grade în 2/ 3 aprilie

temperaturi maxime: în general 2...9 grade

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 50-60 km/h din sector estic în primele 24 de ore, apoi nord-estic și nordic

Izoterma de 0 grade: în jur de 400-700 m

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc